

接種は無料  
(公費負担)

教えて!!



発行・監修：  
長野県 新型コロナウイルス  
ワクチン接種  
アドバイザーチーム  
(2021.4)



# 新型コロナワクチン

どんな流れ?

効果は?

副反応は?

こんな場合接種できるの?



こんな人は接種できません

- 他のワクチンを2週間以内に接種
- 明らかに発熱（37.5℃以上）
- 重い急性疾患にかかっている（ひどい風邪症状や胃腸炎症状など）

相談など  
接種などの  
接種に2回目

接種当日と翌日は  
可能なら予定を  
空けておくのが  
おすすめ



## 接種1回目

副反応が出ても  
2回目接種OK

3週間(21日)あけて

2回接種することで  
望ましい効果が得られます

2回目は接種できません  
1回目のワクチン接種  
でアナフィラキシー

## 接種2回目

3週間あけて  
2回目の接種  
2回目も同じ箇所  
に打つことに  
問題なし



## 接種後

感染対策は  
今まで同様  
継続を

### 接種後も感染対策を。

- 何年も効果が持続するのかはまだ不明
- 多くの人がワクチン接種完了するまで時間がかかる  
接種後も従来の感染対策（マスク、人混みを避ける、ソーシャルディスタンスなど）を継続しましょう。

### 接種 当日



接種後  
待機

15分  
アレルギー  
ありぎ  
アリ

30分  
アレルギー  
ありぎ  
アリ

アレルギー  
なし  
15分待機  
あり  
30分待機

接種後  
当日



- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール摂取は控える

新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。

一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。  
疲れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。



1回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。  
必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。  
また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。



ながお耳鼻咽喉科

参考となるWEB



厚生労働省  
新型コロナワクチン  
についてのQ&A



Q&A  
ごびナビ



「コロワくんの相談室」  
チャットボット

ワクチンに関するよくある質問に答える  
LINEのチャットボットを利用した情報  
提供(医師が中心となって運営)



ワクチンの効果って?

(ファイザー社 / ピオンテック社)

- 重症化予防効果あり
- 高齢者への有効性も高い
- 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

発症予防効果  
**95%**

未接種  
100

接種  
5

他のワクチンなど…  
麻疹ワクチン 95%

インフルエンザワクチン 50%

発症するリスクが  
**1/20**

100人中95人に効く  
という意味ではなく  
接種した人の発症率が  
接種しなかった人の  
発症率より95%少ない  
という意味。


新型コロナワクチンは非常に効果が高いワクチンです



1回目の接種から  
2週間は  
打っていない人と同じ  
と考えて行動を

いつから効くの?

1回目を接種して2週間経ってから  
効果が出始めます。2回目を接種して7日目以降から  
十分な免疫ができるとされています。  
なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチン  
に比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種する  
ことが望ましいです。



# ワクチンの副反応って?



新型コロナワクチン(ファイザー社)  
接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。

頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起りやすいますが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

いつ出る?

接種した1~2日後に副反応が出現することがあります  
ほとんどは3日以内に回復します。



どんな症状?

主に接種部位の痛み・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱など  
があり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。

接種直後の痛みはそれほど強くありません。

発熱時は解熱剤を使って構いません(ワクチンの効果は下がりません)。  
解熱剤はアセトアミノフェンを含むものがおすすめ。

## 体調が回復しない場合は?

こんな時は医療機関に相談

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら  
上気道炎(風邪)や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。  
(これらがワクチンの副反応で通常見られないため)

- 接種後2日以上経っても解熱しない
- 症状が重い



90%が30分以内に  
起きたとされています

# アナフィラキシー?

数分~  
数時間  
以内

簡単に言うと「強いアレルギー反応」のこと

ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合を「アナフィラキシー」といいます。  
新型コロナウイルスワクチンで起こる頻度は20万接種に1回で、  
70%が15分以内、90%が30分以内に起こるとされます。

●皮膚・粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ)

●循環器症状(血圧低下・意識障害)

●呼吸器症状(呼吸が苦しい、呼吸をするときにゼイゼイするなど)

多いのは  
皮膚・粘膜症状  
(80~90%)

## アナフィラキシーショックって?

アナフィラキシーのうち血圧低下や  
意識レベル低下を伴うもの。



## アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。

こんな場合接種できるの?



	接種	こんな場合接種できるの?
当日の発熱	×	当日、明らかに発熱(37.5°C以上)している場合、接種不可。
重い急性疾患	×	ひどい風邪症状や胃腸炎症状など、急性疾患の強い症状がある場合、接種不可。
他のワクチンを2週間以内に接種	×	インフルエンザなど他のワクチンを2週間以内に接種している場合、接種不可。 (ワクチン接種後も、2週間は他のワクチンを接種することはできません。)
アレルギー	○	食物(卵含む)・ペット・ハウスダストのアレルギーや、経口薬へのアレルギーがある場合でも接種は可能。
花粉症	○	花粉症でも接種は可能。
基礎疾患	○	心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方はコロナで重症化しやすい。 不安な場合はかかりつけ医に相談を。
妊娠中	○	相談の上可能。ただし妊娠12週までは控える。 妊娠中は感染で重症化のリスクがあり、接種を推奨。 不安な場合はかかりつけ医に相談を。 お腹の中の赤ちゃんに悪い影響が出たり、将来妊娠しにくくなるとは考えられておらず、海外からもそのような報告はない。
授乳中	○	現時点で特段の懸念が認められているわけではなく海外でも接種の対象。 不安な場合はかかりつけ医に相談を。
16才未満	×	ワクチンは16才以上で承認されており、現在は接種対象ではないが、将来的には対象年齢が広がる可能性も。
薬を内服中	○	内服中の薬により接種できないということはない。 不安な場合はかかりつけ医に相談を。
…抗凝固薬	○	抗凝固薬(血液をさらさらにする薬)を飲んでいる場合は2分以上接種した場所をしっかりと押さえる。
手術後	○	直後でなければ基本的に可能。 投薬中の方など、かかりつけ医と相談を。
1回目の接種後副反応が出た	○	アナフィラキシーなど重い症状でなければ、強い睡れ・熱などの副反応があっても、2回目は可能。同じ場所に接種可能。
1回目の接種後アナフィラキシー	×	アナフィラキシーとはワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現すること。接種不可。 皮膚・粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ) 循環器症状(血圧低下・意識障害) 消化器症状(腹痛、嘔吐)

参考

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389>  
<https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunashitoshi/20210120-00217893/>  
CDC, Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States

CDC Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Questions  
ACIP, COVID-19 vaccine safety update, January 27, 2021  
CDC, Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States 厚生労働省 新型コロナワクチンについてのQ&A